

SK Orotol® plus Dezinfekcia odsávacích zariadení

Orotol®plus je veľmi účinný koncentrát na dezinfekciu, dezodoráciu, čistenie a starostlivosť o stomatologické odsávacie zariadenia a pľuvadlá a je vhodný pre všetky separátory amalgámu. Vybrané dezinfekčné a čistiace zložky pôsobia intenzívne, nepenia a sú šetrné k materiálom a životnému prostrediu.

Zloženie: 100 g Orotol®plus obsahuje: 8,8 g dimetyl-dioktyl-amóniumchloridu 50 %, 1,2 g benzyl-dimetyl-dodecyl-amóniumchloridu 50 %, alkalické čistiace zložky, komplexotvorné látky, špeciálne látky, ktoré zabráňujú vytváraniu peny a pomocné látky.

Spektrum účinkov: bakteriálny, tuberkulocídny, fungicídny¹⁾, omedzene virucídny²⁾ (obalené vírusy, napríklad vacciniavírusy vr. HBV, HCV a HIV ako aj neobalené vírusy, napríklad adenovírusy, norovírusy³⁾). **Zoznam VAH/DGHM.** Vyskušany podľa EN 13727, EN 13624, EN 14348, EN 14562, EN 14563.

¹⁾ Skúška s *Candida albicans*, *Aspergillus niger*.
²⁾ Podľa doporučení RKI (Robert Koch Institut) (Bundesgesundheitsbl. 47, 62-66, 2004).
³⁾ Preizkus na nadomestnom vírusu FCV.

Použitie: Orotol®plus sa používa v 2 % koncentrácii. Příklad nariadení: 20 ml Orotol®plus (zodpovedá mierke v uzávere) doplňte studenou vodou do 1 litra a nasajte pomocou systému údržby OroCup. Odporúčame dezinfekciu a čistenie odsávacieho zariadenia prípravkom Orotol®plus v závislosti od činnosti jedenkrát až dvakrát za týždeň - pred prestávkou na obed a po ukončení používania; pri jednorázovom použití výhradne večer po ukončení činnosti. Pľuvadlo môžete dodatočne vydezinfikovať a vyčistiť prípravkom Orotol®plus.

Pokyny: Po chirurgických zákrokoch nárazovým satím prepláchnite pohárom studenej vody. Neapikujte žiadne peniace látky do sacieho nariadenia ani do pľuvadla.

Ch.-B./použitelné do: vid' podľa.

Dráždivý. Dráždi pokožku. Riziko vážneho poškodenia očí. V prípade kontaktu s očami je potrebné ihneď ich vymyť s veľkým množstvom vody a vyhl'adať lekársku pomoc. Vid kontakt med huden tvätta genast med mycket vatten. Noste vhodné rukavice a ochranné prostriedky na oči a tvár.

DÜRR DENTAL AG Ing. K. Bažil, Průběžná 74a, 100 00 Praha 10, ☎ +42 02 67298458, ✉ +42 06 03508885

SL Orotol® plus Dezinfekcija sesalnih naprav

Orotol®plus je zelo učinkovit koncentrat za sočasno dezinfekcijo, dezodoriranje, čiščenje in negovanje zobozdravniških sesalnih naprav in pľuválnikov ter je primeren za vse amalgam separatore. Izbrane dezinfekcijske in čistilne komponente povzročijo intenzivno, kljub temu pa materialu in okolju neškodljivo nego brez pen.

Sestava: 100 g Orotol®plus vsebuje: 8,8 g 50 % dimetil-diocitil-amonijevega klorida, 1,2 50 % benzil-dimetil-dodecil-amonijevega klorida, alkalne čistilne komponente kompleksni tvorec, posebni razpenjevalec, pomožne snovi.

Spekter učinkovanja: Bakterioid, tuberkulocid, fungicid¹⁾, omejeno viruzid²⁾ (virusi z ovojnico, kakor na primer vacciniavirusi, vključno z HBV, HCV in HIV, ter virusi brez ovojnice, kot so adenovirusi, norovirusi³⁾). **Seznam VAH/DGHM.** Preverjen v skladu s EN 13727, EN 13624, EN 14348, EN 14562, EN 14563.

¹⁾ Preizkus s *Candida albicans*, *Aspergillus niger*.
²⁾ V skladu s priporočili RKI (Robert Koch Institut) (Ministrstvo za zdravstvo 47, 62-66, 2004).
³⁾ Preizkus na nadomestnem virusu FCV.

naočale / zaštitu za lice.

Zastupnik u Hrvatskoj: DÜRR DENTAL AUSTRIA
Feldstraße 7 a, A-6020 Innsbruck, ☎ +43 512 572834

HU Orotol® plus Nyálszívó rendszer fertőtlenítőszer

Az Orotol®plus nagy hatékonyságú koncentrátum fogorvosi nyálszívó berendezések és szájbítló tálak egyidejű fertőtlenítésére, szagtalánítására, tisztítására és ápolására, és minden amalgám leválasztó egységhez alkalmazható. A kiválasztott fertőtlenítő és tisztító komponensek intenzív, mégis anyag- és környezetkímélő, habmentes ápolást biztosítanak.

Nápotki: Po kirurških posegih posesajte v curkih kozarec mrzle vode. V sesalno napravo in pľuválnik ne dodajajte nobenih penečih se sredstev.

Ch.B./uporabno do: glej natisk.

Dražlino. Draži kožo. Nevarnost hudih poškodb oči. Če pride v oči, takoj izpirati z obilo vode in poiskati zdravniško pomoč. Ob stiku s kožo takoj izprati z obilo vode. Nositi primerne zaščitne rokavice in zaščito za oči/obraz.

Összetétel: 100 g Orotol®plus tartalma: 8,8 g dimetil-dioktil-ammoniumklorid 50 %, 1,2 g benzil-dimetil-dodecil-ammoniumklorid 50 %, lúgos tisztító komponensek, komplex vegyületképzők, speciális habosodásgátlók, segédanyagok.

Hatásspektrum: Bakterioid, tuberkulocid, fungicid¹⁾, korlátozottan virucid²⁾ (burokkal rendelkező vírusok, mint az vacciniavírusok, köztük HBV, HCV, HIV, valamint burok nélküli vírusok, mint pl. adenovírusok, norovírusok³⁾). **VAH/DGHM-lista.** EN 13727, EN 13624, EN 14348, EN 14562, EN 14563 szerint ellenőrizve.

¹⁾ Vizsgálat *Candida albicans*, *Aspergillus niger*.
²⁾ Az RKI (Robert Koch Intézet) ajánlása alapján (Szövetségi Egészségügyi Hivatal 47, 62-66, 2004).
³⁾ Vizsgálat FCV helyettesítő vírussal.

Alkalmazás: Az Orotol®plus-t 2 %-os koncentrációban alkalmazzuk. Ehhez adagoljon pl. 20 ml benzil-dimetil-dodecil-amonijeva klorida 50%, alkalne komponente za čiščenje, kelirajuće tvari, posebne tvari za uklanjanje pjene i pomoćne tvari u vodenoj otopini.

Sastav: 100 g sredstva Orotol®plus sadrži: 8,8 g dimetil-dioktil-amonijeva klorida 50%, 1,2 g benzil-dimetil-dodecil-amonijeva klorida 50%, alkalne komponente za čiščenje, kelirajuće tvari, posebne tvari za uklanjanje pjene i pomoćne tvari u vodenoj otopini.

Raspon djelovanja: Bakterioidno, uklj. bakterije tuberkuloze, fungicidno¹⁾, ograničeno virucidno²⁾ (ovijeni virusi kao što je Vaccinia, uključujući HBV, HCV i HIV te neovijeni virusi kao što su adenovirusi, norovirusi³⁾). **Napomena VAH/DGHM.** Testirano u skladu s direktivama EN 13727, EN 13624, EN 14348, EN 14476, EN 145651, EN 14562, EN 14563.

¹⁾ Testirano na *Candida albicans*, *Aspergillus niger*.
²⁾ U skladu s preporukama Instituta Robert Koch (Časopis za javno zdravstvo Republike Njemačke 47, 62-66, 2004).
³⁾ Testirano na surugat-virus FCV.

Primjena: Orotol®plus primjenjuje se u 2-postotnoj koncentraciji. Umiješajte 20 ml sredstva Orotol®plus u hladnom vodom do količine od jedne litre te usište koristeći OroCup. U umivaonik za ispiranje usta također umiješajte najmanje 250 ml otopine.

Preporučujemo da sisaljke čistite i dezinficirate sredstvom Orotol®plus jednom do dvaput dnevno, ovisno o zaprljanju, i to prije pauze za ručak i po završetku rada, a ako ste sisaljku upotrijebili samo jednom, tada je čistite isključivo po završetku rada. Umivaonik za ispiranje usta po potrebi dodatno dezinficirajte i očistite sredstvom Orotol®plus.

Upozorenja: nakon kirurških zahvata postupeno usište čašu hladne vode. Ne stavljajte pjenušava sredstva u sisaljku i umivaonik za ispiranje usta.

Ch.-B./upotrebljivo do: vidi otisak.

Nadražujuće. Nadražuje kožu. Opasnost od ozbiljne ozljede očiju. Ako dođe u dodir s očima, odmah temeljito isperite vodom i obratite se liječniku. Ako dođe u dodir s kožom, odmah isprati s mnogo vode. Tijekom rada sa sredstvom nositi prikladne zaštitne rukavice i zaštitne naočale / zaštitu za lice.

Dráždivý. Nadrážuje kožu. Opasnosť od ozbiljnej ozľede očíu. Ako dođe u dodir s očima, odmah temeljito isperite vodom i obratite se liječniku. Ako dođe u dodir s kožom, odmah isprati s mnogo vode. Tijekom rada sa sredstvom nositi prikladne zaštitne rukavice i zaštitne naočale / zaštitu za lice.

ja HIV, kuid ka kapslita viirused, nagu adenoviirused, noroviirused³⁾). **VAH/DGHM nimekiri.** Kontrollitud vastavalt EN 13727, EN 13624, EN 14348, EN 14562, EN 14563-le.

¹⁾ Kontrollitud *Candida albicans*iga, *Aspergillus niger*iga.
²⁾ Vastavalt Robert Kochi instituudi soovitusetele (Saksamaa tervishoiuamet 47, 62-66, 2004).
³⁾ Kontrolli surrogatviiruse FCV.

Kasutamise: Orotol®plusi kasutatakse 2 %-lises kontsentratsioonis. Selleks doseerige nt 20 ml Orotol®plusi kinnituskorgis oleva mõõdutupsiga (markering vastav 20 ml-le) ning lahjendage 1 l külma veega ning imege OroCupi või Orotol®-hooldussüsteemi abil läbi.

Soovitame aspiratsiooni seadet olenevalt koormusest üks kuni kaks korda päevas - enne lõunapausi ja peale ravi lõppu, ühekordselt kasutamisel ainult ühtl peale ravi lõppu - Orotol®plusiga desinfitseerida ja puhastada. Vajadusel desinfitseerige ja puhastage suuloputuskauss Orotol®plusiga.

Süüdis: 100 g Orotol®plus yra: 8,8 g 50 % dimetildioktilamionio chlorido, 1,2 g 50 % benzil-dimetildo-decilamionio chlorido, šarmini valymo komponentu, kompleksinių, pagalbinių ir specialių putas naikinančių medžiagų.

Poveikio spektras: baktericidas, veikiantis tuberkuliozės lazdeles, fungicidas¹⁾, ribotai virucidinis²⁾ (apvalkėlieji virusai, tokie kaip Vaccinia virusai, jsk. HBV, HCV, ŽIV, bei neapvalkėlieji virusai, tokie kaip Adeno virusai, Noro virusai³⁾). **VAH/DGHM sąrašas.** Patikrintas pagal EN 13727, EN 13624, EN 14348, EN 14562, EN 14563 standartus.

¹⁾ Patikrinimas su candida albicans, aspergillus niger.
²⁾ Pagal RKI (Robert'o Koch'o instituto) rekomendacijas (Federalinis sveikatos t. 47, 62-66, 2004).
³⁾ Patikrinta su FCV surrogatinio virusu.

Naudojimo būdas: Orotol®plus naudojamas 2 % koncentracijos. Atmatuokite, pavyzdžiui, 20 ml Orotol®plus specialia stikline (žyma atitinka 20 ml), supilkite į 1 litrą šalto vandens ir šį tirpalą prasiurbkite, naudodami OroCup arba Orotol® priežiūros sistemą.

Rekomenduojame siurbimo įrenginį, priklausanai nuo jo apkrovimo, dezinfekuoti ir valyti su Orotol®plus vieng - du kartus per dieną - prieš pietų pertrauką ir pasibaigus procedūrai, jei naudojama vieng kartą - tik vakare, užbaigus procedūrą. Esant reikalui, su Orotol®plus dezinfekuokite ir išvalykite taip pat burnos skalavimo kriauklę.

Nurodymai: Po chirurginės procedūros, prasiurbkite su pertrūkiais šalto vandens stikline. Į siurbimo įrenginį ir burnos skalavimo kriauklę nepilkite putojančių priemonių.

Ch.-B./galiojimo laikas iki: žr. užrašą.

Dirginanti. Dirgina odą. Gali smarkiai pažeisti akis. Patekus į akis, nedelsiant gerai praplauk vandeniu ir kreipis į gydytoją. Patekus ant odos, nedelsiant gerai nuplauk vandeniu. Muvet tinkamas piršines ir naudoti akių (veido) apsaugos priemones.

Състав: 100 g Orotol®plus съдържат: 8,8 g диметил-диоктил-амониев хлорид 50 %, 1,2 g бензил-диметил-додецил-амониев хлорид 50 %, алкални почистващи компоненти, комплексообразуватели, специални пенеотделители и помощни вещества във воден разтвор.

Спектър на действие: Бактерицидно вкл. ТБК, фунгицидно¹⁾, ограничено вирусцидно²⁾ (вируси с обвивка като вируси Vaccinia, вкл. HBV, HCV и HIV, както и вируси без обвивка като вируси Adeno, Heno, virusi Noro³⁾).

Списък на Асоциацията за приложена микробиология (VAH)/Германското дружество за хигиена и микробиология (DGHM). Изпитан съгласно EN 13727, EN 13624, EN 14348, EN 14562, EN 14563.

¹⁾ Тест с *Candida albicans*, *Aspergillus niger*.
²⁾ Съгласно препоръката на Института "Robert Koch" (Bundesgesundheitsbl. 47, 62-66, 2004).
³⁾ Тест със сурогатния вирус FCV.

Употреба: Orotol®plus се използва в 2 %-ова концентрация. Дозейте 20 ml Orotol®plus със студена вода до 1 литър и просмучете с помощта на системата за поддръжка OroCup или Orotol®.

Препоръчваме да дезинфекцирате и почиствате аспиратора с Orotol®plus, един до два пъти дневно - преди обедната почивка и след края на работния ден, при еднократна употреба - само вечер след края на работното време. При нужда дезинфекцирайте и почиствайте пľувалника допълнително с Orotol®plus.

Указания: След хирургични интервенции просмучете бързо една чаша студена вода. В аспиратора и в пľувалника не наливайте пенещи се препарати.

Ch.-B./valabil până la: vezi inscripția.

Разпространение в България: DÜRR DENTAL AUSTRIA
Feldstraße 7 a, A-6020 Innsbruck, ☎ +43 512 572834

вода до 1 литър и просмучете с помощта на системата за поддръжка OroCup или Orotol®.

Препоръчваме да дезинфекцирате и почиствате аспиратора с Orotol®plus, в зависимост от замърсяването, един до два пъти дневно - преди обедната почивка и след края на работния ден, при еднократна употреба - само вечер след края на работното време. При нужда дезинфекцирайте и почиствайте пľувалника допълнително с Orotol®plus.

Указания: След хирургични интервенции просмучете бързо една чаша студена вода. В аспиратора и в пľувалника не наливайте пенещи се препарати.

Ch.-B./valabil până la: vezi inscripția.

Разпространение в България: DÜRR DENTAL AUSTRIA
Feldstraße 7 a, A-6020 Innsbruck, ☎ +43 512 572834

Применение: Оrotol®plus используется в виде 2 %-ого препарата. Для этого разбавить 20 мл Orotol®plus на 1 литр холодной водой и используя OroCup пропустить через отсасывающую систему.

Мы рекомендуем дезинфицировать и одновременно промывать отсасывающие системы Orotol®plus в зависимости от их загрязненности, от одного до двух раз в день, при однократном применении - после рабочего дня.

Указания: после хирургического вмешательства по частично промыть систему стаканом холодной воды.

Ch.-B./срок годности: см. печать.

Раздражающее. Раздражает глаза и кожу. Вызывает серьезные поражения глаз. В случае попадания в глаза немедленно промыть достаточным количеством воды и обратиться к врач. После попадания на кожу немедленно промыть большим количеством воды. Носить подходящие перчатки и защиту лица/глаз.

Състав: 100 g Orotol®plus съдържат: 8,8 g диметил-диоктил-амониев хлорид 50 %, 1,2 g бензил-диметил-додецил-амониев хлорид 50 %, алкални почистващи компоненти, комплексообразуватели, специални пенеотделители и помощни вещества във воден разтвор.

Спектър на действие: Бактерицидно вкл. ТБК, фунгицидно¹⁾, ограничено вирусцидно²⁾ (вируси с обвивка като вируси Vaccinia, вкл. HBV, HCV и HIV, както и вируси без обвивка като вируси Adeno, Heno, virusi Noro³⁾).

Списък на Асоциацията за приложена микробиология (VAH)/Германското дружество за хигиена и микробиология (DGHM). Изпитан съгласно EN 13727, EN 13624, EN 14348, EN 14562, EN 14563.

¹⁾ Тест с *Candida albicans*, *Aspergillus niger*.
²⁾ Съгласно препоръката на Института "Robert Koch" (Bundesgesundheitsbl. 47, 62-66, 2004).
³⁾ Тест със сурогатния вирус FCV.

Употреба: Orotol®plus се използва в 2 %-ова концентрация. Дозейте 20 ml Orotol®plus със студена вода до 1 литър и просмучете с помощта на системата за поддръжка OroCup или Orotol®.

Препоръчваме да дезинфекцирате и почиствате аспиратора с Orotol®plus, един до два пъти дневно - преди обедната почивка и след края на работния ден, при еднократна употреба - само вечер след края на работното време. При нужда дезинфекцирайте и почиствайте пľувалника допълнително с Orotol®plus.

Указания: След хирургични интервенции просмучете бързо една чаша студена вода. В аспиратора и в пľувалника не наливайте пенещи се препарати.

Ch.-B./valabil până la: vezi inscripția.

Разпространение в България: DÜRR DENTAL AUSTRIA
Feldstraße 7 a, A-6020 Innsbruck, ☎ +43 512 572834

Применение: Оrotol®plus используется в виде 2 %-ого препарата. Для этого разбавить 20 мл Orotol®plus на 1 литр холодной водой и используя OroCup пропустить через отсасывающую систему.

Мы рекомендуем дезинфицировать и одновременно промывать отсасывающие системы Orotol®plus в зависимости от их загрязненности, от одного до двух раз в день, при однократном применении - после рабочего дня.

Указания: после хирургического вмешательства по частично промыть систему стаканом холодной воды.

Ch.-B./срок годности: см. печать.

Раздражающее. Раздражает глаза и кожу. Вызывает серьезные поражения глаз. В случае попадания в глаза немедленно промыть достаточным количеством воды и обратиться к врач. После попадания на кожу немедленно промыть большим количеством воды. Носить подходящие перчатки и защиту лица/глаз.

Състав: 100 г средства Orotol®plus содержат: 8,8 g 50 %-ого диметилдиоктиламония хлорида, 1,2 g 50 %-ого бензилдиметилдодециламмония хлорида, щелочные чистящие компоненты, комплексирующие агенты, пеногасящие и вспомогательные вещества.

Спектр действия: бактерицид, туберкулоцид, фунгицид¹⁾, вируцид с ограниченным действием²⁾ (вирусы с оболочкой, типа Vaccinia-вирусов, вкл. вирусы гепатита В, гепатита С и ВИЧ, а также безоболочечные вирусы типа Adeno-вирусов, Ного-вирусов³⁾). **Занесен в список VAH/DGHM.** Проверено в соответствии с EN 13727, EN 13624, EN 14348, EN 14562, EN 14563.

¹⁾ Испытания проводились с *Candida albicans*, *Aspergillus niger*.
²⁾ В соответствии с рекомендацией Института Роберта Коха (Bundesgesundheitsbl. 47, 62-66, 2004).
³⁾ Тест на сурогатный вирус FCV.

Применение: Оrotol®plus используется в виде 2 %-ого препарата. Для этого разбавить 20 мл Orotol®plus на 1 литр холодной водой и используя OroCup пропустить через отсасывающую систему.

Мы рекомендуем дезинфицировать и одновременно промывать отсасывающие системы Orotol®plus в зависимости от их загрязненности, от одного до двух раз в день, при однократном применении - после рабочего дня.

Указания: после хирургического вмешательства по частично промыть систему стаканом холодной воды.

Ch.-B./срок годности: см. печать.

Раздражающее. Раздражает глаза и кожу. Вызывает серьезные поражения глаз. В случае попадания в глаза немедленно промыть достаточным количеством воды и обратиться к врач. После попадания на кожу немедленно промыть большим количеством воды. Носить подходящие перчатки и защиту лица/глаз.

Състав: 100 g Orotol®plus съдържат: 8,8 g диметил-диоктил-амониев хлорид 50 %, 1,2 g бензил-диметил-додецил-амониев хлорид 50 %, алкални почистващи компоненти, комплексообразуватели, специални пенеотделители и помощни вещества във воден разтвор.

Спектър на действие: Бактерицидно вкл. ТБК, фунгицидно¹⁾, ограничено вирусцидно²⁾ (вируси с обвивка като вируси Vaccinia, вкл. HBV, HCV и HIV, както и вируси без обвивка като вируси Adeno, Heno, virusi Noro³⁾).

Списък на Асоциацията за приложена микробиология (VAH)/Германското дружество за хигиена и микробиология (DGHM). Изпитан съгласно EN 13727, EN 13624, EN 14348, EN 14562, EN 14563.

¹⁾ Тест с *Candida albicans*, *Aspergillus niger*.
²⁾ Съгласно препоръката на Института "Robert Koch" (Bundesgesundheitsbl. 47, 62-66, 2004).
³⁾ Тест със сурогатния вирус FCV.

Употреба: Orotol®plus се използва в 2 %-ова концентрация. Дозейте 20 ml Orotol®plus със студена вода до 1 литър и просмучете с помощта на системата за поддръжка OroCup или Orotol®.

Препоръчваме да дезинфекцирате и почиствате аспиратора с Orotol®plus, един до два пъти дневно - преди обедната почивка и след края на работния ден, при еднократна употреба - само вечер след края на работното време. При нужда дезинфекцирайте и почиствайте пľувалника допълнително с Orotol®plus.

Указания: След хирургични интервенции просмучете бързо една чаша студена вода. В аспиратора и в пľувалника не наливайте пенещи се препарати.

Ch.-B./valabil până la: vezi inscripția.

Разпространение в България: DÜRR DENTAL AUSTRIA
Feldstraße 7 a, A-6020 Innsbruck, ☎ +43 512 572834

Применение: Оrotol®plus используется в виде 2 %-ого препарата. Для этого разбавить 20 мл Orotol®plus на 1 литр холодной водой и используя OroCup пропустить через отсасывающую систему.

Мы рекомендуем дезинфицировать и одновременно промывать отсасывающие системы Orotol®plus в зависимости от их загрязненности, от одного до двух раз в день, при однократном применении - после рабочего дня.

Указания: после хирургического вмешательства по частично промыть систему стаканом холодной воды.

Ch.-B./срок годности: см. печать.

Раздражающее. Раздражает глаза и кожу. Вызывает серьезные поражения глаз. В случае попадания в глаза немедленно промыть достаточным количеством воды и обратиться к врач. После попадания на кожу немедленно промыть большим количеством воды. Носить подходящие перчатки и защиту лица/глаз.

Състав: 100 г средства Orotol®plus содержат: 8,8 g 50 %-ого диметилдиоктиламония хлорида, 1,2 g 50 %-ого бензилдиметилдодециламмония хлорида, щелочные чистящие компоненты, комплексирующие агенты, пеногасящие и вспомогательные вещества.

Спектр действия: бактерицид, туберкулоцид, фунгицид¹⁾, вируцид с ограниченным действием²⁾ (вирусы с оболочкой, типа Vaccinia-вирусов, вкл. вирусы гепатита В, гепатита С и ВИЧ, а также безоболочечные вирусы типа Adeno-вирусов, Ного-вирусов³⁾). **Занесен в список VAH/DGHM.** Проверено в соответствии с EN 13727, EN 13624, EN 14348, EN 14562, EN 14563.

¹⁾ Испытания проводились с *Candida albicans*, *Aspergillus niger*.
²⁾ В соответствии с рекомендацией Института Роберта Коха (Bundesgesundheitsbl. 47, 62-66, 2004).
³⁾ Тест на сурогатный вирус FCV.

Применение: Оrotol®plus используется в виде 2 %-ого препарата. Для этого разбавить 20 мл Orotol®plus на 1 литр холодной водой и используя OroCup пропустить через отсасывающую систему.

Мы рекомендуем дезинфицировать и одновременно промывать отсасывающие системы Orotol®plus в зависимости от их загрязненности, от одного до двух раз в день, при однократном применении - после рабочего дня.

Указания: после хирургического вмешательства по частично промыть систему стаканом холодной воды.

Ch.-B./срок годности: см. печать.

Раздражающее. Раздражает глаза и кожу. Вызывает серьезные поражения глаз. В случае попадания в глаза немедленно промыть достаточным количеством воды и обратиться к врач. После попадания на кожу немедленно промыть большим количеством воды. Носить подходящие перчатки и защиту лица/глаз.

Състав: 100 g Orotol®plus съдържат: 8,8 g диметил-диоктил-амониев хлорид 50 %, 1,2 g бензил-диметил-додецил-амониев хлорид 50 %, алкални почистващи компоненти, комплексообразуватели, специални пенеотделители и помощни вещества във воден разтвор.

Спектър на действие: Бактерицидно вкл. ТБК, фунгицидно¹⁾, ограничено вирусцидно²⁾ (вируси с обвивка като вируси Vaccinia, вкл. HBV, HCV и HIV, както и вируси без обвивка като вируси Adeno, Heno, virusi Noro³⁾).

Списък на Асоциацията за приложена микробиология (VAH)/Германското дружество за хигиена и микробиология (DGHM). Изпитан съгласно EN 13727, EN 13624, EN 14348, EN 14562, EN 14563.

¹⁾ Тест с *Candida albicans*, *Aspergillus niger*.
²⁾ Съгласно препоръката на Института "Robert Koch" (Bundesgesundheitsbl. 47, 62-66, 2004).
³⁾ Тест със сурогатния вирус FCV.

</

simultaneous disinfection, deodorization, cleaning and care of dental suction systems as well as spittoon bowls, being likewise suitable for all amalgam separators.

Composition: 100 g Orotol®plus contain 8,8 g dimethyl-diocetyl-ammoniumchloride 50%, 1,2 g benzyl-dimethyl-dodecyl-ammoniumchloride 50%, alkaline cleansing agents, complexing agents, special antifoaming agents, adjuvants.

Effective spectrum: Bactericidal, tuberculocidal, fungicidal¹⁾, limited virucidal activity²⁾ (encapsulated viruses such as vaccinia viruses, incl. HBV, HCV, HIV as well as non-encapsulated viruses, such as adeno viruses, noro viruses³⁾). **List of VAH/DGHM.** Tested in accordance with EN 13727, EN 13624, EN 14348, EN 14562, EN 14562, EN 14563.

Zusammensetzung: 100 g Orotol®plus enthalten: 8,8 g Dimethyl-diocetyl-ammoniumchlorid 50 %, 1,2 g Benzyl-dimethyl-dodecyl-ammoniumchlorid 50 %, alkalische Reinigungskomponenten, Komplexbildner, Spezialentschäumer, Hilfsstoffe.

Wirkungsspektrum: Bakterizid, tuberkulozid, fungizid¹⁾, begrenzt viruzid²⁾ (behüllte Viren wie Vaccinia-Viren inkl. HBV, HCV und HIV sowie unbehüllte Viren wie Adeno-Viren, Noro-Viren³⁾). **VAH/DGHM-Liste und ÖGHMP-Verzeichnis.** Geprüft gemäß EN 13727, EN 13624, EN 14348, EN 14562, EN 14563.

Anwendung: Orotol®plus wird in 2 %iger Konzentration angewendet. Dazu z.B. 20 ml Orotol®plus über Messbecher im Verschluß (Markierung entspricht 20 ml) dosieren, mit kaltem Wasser auf 1 Liter auffüllen und unter Verwendung des OroCup oder des Orotol®-Pflegesystems durchsaugen.

Anwendung	Konzentration	Einwirkzeit
Sauganlagendesinfektion	2 %	60 Min.
Bakterien und Pilze ¹⁾	2 %	5 Min.
Tb-Bakterien	2 %	60 Min.
Aspergillus niger	2 %	60 Min.
Vaccinia-Viren inkl. HBV HCV, HIV ²⁾	2 %	10 Min.
Adeno-Viren	2 %	30 Min.
Noro-Viren ³⁾	2 %	15 Min.

¹⁾ Prüfung mit Candida albicans.
²⁾ Gemäß Empfehlung des RKI (Bundesgesundheitsbl. 47, 62-66, 2004).
³⁾ Prüfung am Surrogatvirus FCV.

Wir empfehlen, die Sauganlage, je nach Belastung, ein- bis zweimal täglich - vor der Mittagspause und nach Behandlungsschritt, bei einmaliger Anwendung ausschließlich abends nach Behandlungsschluss mit Orotol®plus zu desinfizieren und zu reinigen. Mundspülbecken ggf. zusätzlich mit Orotol®plus desinfizieren und reinigen.
Hinweise: Nach chirurgischen Eingriffen ein Glas kaltes Wasser stoßweise durchsaugen. In die Sauganlage und das Mundspülbecken keine schäumenden Mittel geben.

Ch.-B./verwendbar bis: siehe Aufdruck.

Reizend. Reizt die Haut. Gefahr ernster Augenschäden. Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren. Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser. Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und Schutzbrille/ Gesichtsschutz tragen.

Vertrieb in Österreich: DÜRR DENTAL AUSTRIA, Feldstraße 7a, A-6020 Innsbruck, ☎ +43 512 572834
Vertrieb in Schweiz: DÜRR DENTAL AG, Seestraße 108, CH-9326 Horn, ☎ +41 71 8441030

¹⁾ Test réalisé avec des Candida albicans, Aspergillus niger.

²⁾ Conformément aux recommandations du RKI (Institut Robert Koch, Allemagne) (Bulletin fédéral de santé 47, 62-66, 2004).

³⁾ Test sur le succédané VFC.

Mode d'emploi: L'Orotol®plus s'emploie à une concentration de 2% (= 20 ml pour 1 litre d'eau froide) à l'aide de l'OroCup ou du nécessaire d'entretien Orotol®. La durée d'action est de 60 minutes. L'Orotol®plus est recommandé pour la désinfection et le nettoyage du

système d'aspiration une à deux fois par jour, selon vos besoins et en tout cas, toujours le soir après les consultations lorsque la désinfection n'est faite qu'une fois par jour. Si nécessaire, désinfecter et nettoyer également le crachoir avec l'Orotol®plus.

Précautions: Après toute aspiration chirurgicale, aspirer par à-coups, l'équivalent d'un verre d'eau froide. Ne jamais utiliser de produits moussants dans le système d'aspiration et le crachoir.

Ch.-B./date de péremption: voir le marquage.

Irritant. Irritant pour la peau. Risque de lésions oculaires graves. En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste.
Après contact avec la peau, se laver immédiatement et abondamment avec de l'eau. Porter des gants appropriés et un appareil de protection des yeux/du visage.

DÜRR DENTAL FRANCE, 26, rue Diderot, F-92000 Nanterre, ☎ +33 1 55691150
DÜRR DENTAL BELGIUM, Moldenheidebaan 97, B-3191 Hever, ☎ +32 15616271

¹⁾ Testing with Candida albicans, Aspergillus niger.

²⁾ In accordance with the recommendations of the RKI (Robert Koch Institute) (Bundesgesundheitsbl. 47, 62-66, 2004).

³⁾ Test for FCV surrogate virus.

Directions for use: Orotol®plus is applied as a 2% solution (= 20 ml to 1 litre of water) using the OroCup or the Orotol®-Care System. Allow 60 minutes for effectiveness.
We recommend disinfecting and cleaning suction systems once or twice a day, according to work-load. Once-daily disinfecting and cleaning should be done at the end of the day. If necessary, disinfect and clean spittoon bowl with Orotol®plus, too.
Caution: After surgical procedures, aspirate a glass of cold water intermittently. No foaming agents must enter the suction system or the spittoon bowl.
No foaming agents must enter the suction system or the spittoon bowl.

Ch.-B./expiry date: see imprint.
Sauganlagendesinfektion 2 % 60 Min.
Bakterien und Pilze¹⁾ 2 % 5 Min.
Tb-Bakterien 2 % 60 Min.
Aspergillus niger 2 % 60 Min.
Vaccinia-Viren inkl. HBV HCV, HIV²⁾ 2 % 10 Min.
Adeno-Viren 2 % 30 Min.
Noro-Viren³⁾ 2 % 15 Min.

Ch.-B./expiry date: see imprint.
Sauganlagendesinfektion 2 % 60 Min.
Bakterien und Pilze¹⁾ 2 % 5 Min.
Tb-Bakterien 2 % 60 Min.
Aspergillus niger 2 % 60 Min.
Vaccinia-Viren inkl. HBV HCV, HIV²⁾ 2 % 10 Min.
Adeno-Viren 2 % 30 Min.
Noro-Viren³⁾ 2 % 15 Min.

Ch.-B./expiry date: see imprint.
Sauganlagendesinfektion 2 % 60 Min.
Bakterien und Pilze¹⁾ 2 % 5 Min.
Tb-Bakterien 2 % 60 Min.
Aspergillus niger 2 % 60 Min.
Vaccinia-Viren inkl. HBV HCV, HIV²⁾ 2 % 10 Min.
Adeno-Viren 2 % 30 Min.
Noro-Viren³⁾ 2 % 15 Min.

Ch.-B./expiry date: see imprint.
Sauganlagendesinfektion 2 % 60 Min.
Bakterien und Pilze¹⁾ 2 % 5 Min.
Tb-Bakterien 2 % 60 Min.
Aspergillus niger 2 % 60 Min.
Vaccinia-Viren inkl. HBV HCV, HIV²⁾ 2 % 10 Min.
Adeno-Viren 2 % 30 Min.
Noro-Viren³⁾ 2 % 15 Min.

Ch.-B./expiry date: see imprint.
Sauganlagendesinfektion 2 % 60 Min.
Bakterien und Pilze¹⁾ 2 % 5 Min.
Tb-Bakterien 2 % 60 Min.
Aspergillus niger 2 % 60 Min.
Vaccinia-Viren inkl. HBV HCV, HIV²⁾ 2 % 10 Min.
Adeno-Viren 2 % 30 Min.
Noro-Viren³⁾ 2 % 15 Min.

Ch.-B./expiry date: see imprint.
Sauganlagendesinfektion 2 % 60 Min.
Bakterien und Pilze¹⁾ 2 % 5 Min.
Tb-Bakterien 2 % 60 Min.
Aspergillus niger 2 % 60 Min.
Vaccinia-Viren inkl. HBV HCV, HIV²⁾ 2 % 10 Min.
Adeno-Viren 2 % 30 Min.
Noro-Viren³⁾ 2 % 15 Min.

Ch.-B./expiry date: see imprint.
Sauganlagendesinfektion 2 % 60 Min.
Bakterien und Pilze¹⁾ 2 % 5 Min.
Tb-Bakterien 2 % 60 Min.
Aspergillus niger 2 % 60 Min.
Vaccinia-Viren inkl. HBV HCV, HIV²⁾ 2 % 10 Min.
Adeno-Viren 2 % 30 Min.
Noro-Viren³⁾ 2 % 15 Min.

Ch.-B./expiry date: see imprint.
Sauganlagendesinfektion 2 % 60 Min.
Bakterien und Pilze¹⁾ 2 % 5 Min.
Tb-Bakterien 2 % 60 Min.
Aspergillus niger 2 % 60 Min.
Vaccinia-Viren inkl. HBV HCV, HIV²⁾ 2 % 10 Min.
Adeno-Viren 2 % 30 Min.
Noro-Viren³⁾ 2 % 15 Min.

Ch.-B./expiry date: see imprint.
Sauganlagendesinfektion 2 % 60 Min.
Bakterien und Pilze¹⁾ 2 % 5 Min.
Tb-Bakterien 2 % 60 Min.
Aspergillus niger 2 % 60 Min.
Vaccinia-Viren inkl. HBV HCV, HIV²⁾ 2 % 10 Min.
Adeno-Viren 2 % 30 Min.
Noro-Viren³⁾ 2 % 15 Min.

Ch.-B./expiry date: see imprint.
Sauganlagendesinfektion 2 % 60 Min.
Bakterien und Pilze¹⁾ 2 % 5 Min.
Tb-Bakterien 2 % 60 Min.
Aspergillus niger 2 % 60 Min.
Vaccinia-Viren inkl. HBV HCV, HIV²⁾ 2 % 10 Min.
Adeno-Viren 2 % 30 Min.
Noro-Viren³⁾ 2 % 15 Min.

Ch.-B./expiry date: see imprint.
Sauganlagendesinfektion 2 % 60 Min.
Bakterien und Pilze¹⁾ 2 % 5 Min.
Tb-Bakterien 2 % 60 Min.
Aspergillus niger 2 % 60 Min.
Vaccinia-Viren inkl. HBV HCV, HIV²⁾ 2 % 10 Min.
Adeno-Viren 2 % 30 Min.
Noro-Viren³⁾ 2 % 15 Min.

Ch.-B./expiry date: see imprint.
Sauganlagendesinfektion 2 % 60 Min.
Bakterien und Pilze¹⁾ 2 % 5 Min.
Tb-Bakterien 2 % 60 Min.
Aspergillus niger 2 % 60 Min.
Vaccinia-Viren inkl. HBV HCV, HIV²⁾ 2 % 10 Min.
Adeno-Viren 2 % 30 Min.
Noro-Viren³⁾ 2 % 15 Min.

Ch.-B./expiry date: see imprint.
Sauganlagendesinfektion 2 % 60 Min.
Bakterien und Pilze¹⁾ 2 % 5 Min.
Tb-Bakterien 2 % 60 Min.
Aspergillus niger 2 % 60 Min.
Vaccinia-Viren inkl. HBV HCV, HIV²⁾ 2 % 10 Min.
Adeno-Viren 2 % 30 Min.
Noro-Viren³⁾ 2 % 15 Min.

Ch.-B./expiry date: see imprint.
Sauganlagendesinfektion 2 % 60 Min.
Bakterien und Pilze¹⁾ 2 % 5 Min.
Tb-Bakterien 2 % 60 Min.
Aspergillus niger 2 % 60 Min.
Vaccinia-Viren inkl. HBV HCV, HIV²⁾ 2 % 10 Min.
Adeno-Viren 2 % 30 Min.
Noro-Viren³⁾ 2 % 15 Min.

Ch.-B./expiry date: see imprint.
Sauganlagendesinfektion 2 % 60 Min.
Bakterien und Pilze¹⁾ 2 % 5 Min.
Tb-Bakterien 2 % 60 Min.
Aspergillus niger 2 % 60 Min.
Vaccinia-Viren inkl. HBV HCV, HIV²⁾ 2 % 10 Min.
Adeno-Viren 2 % 30 Min.
Noro-Viren³⁾ 2 % 15 Min.

Ch.-B./expiry date: see imprint.
Sauganlagendesinfektion 2 % 60 Min.
Bakterien und Pilze¹⁾ 2 % 5 Min.
Tb-Bakterien 2 % 60 Min.
Aspergillus niger 2 % 60 Min.
Vaccinia-Viren inkl. HBV HCV, HIV²⁾ 2 % 10 Min.
Adeno-Viren 2 % 30 Min.
Noro-Viren³⁾ 2 % 15 Min.

Ch.-B./expiry date: see imprint.
Sauganlagendesinfektion 2 % 60 Min.
Bakterien und Pilze¹⁾ 2 % 5 Min.
Tb-Bakterien 2 % 60 Min.
Aspergillus niger 2 % 60 Min.
Vaccinia-Viren inkl. HBV HCV, HIV²⁾ 2 % 10 Min.
Adeno-Viren 2 % 30 Min.
Noro-Viren³⁾ 2 % 15 Min.

Ch.-B./expiry date: see imprint.
Sauganlagendesinfektion 2 % 60 Min.
Bakterien und Pilze¹⁾ 2 % 5 Min.
Tb-Bakterien 2 % 60 Min.
Aspergillus niger 2 % 60 Min.
Vaccinia-Viren inkl. HBV HCV, HIV²⁾ 2 % 10 Min.
Adeno-Viren 2 % 30 Min.
Noro-Viren³⁾ 2 % 15 Min.

Ch.-B./expiry date: see imprint.
Sauganlagendesinfektion 2 % 60 Min.
Bakterien und Pilze¹⁾ 2 % 5 Min.
Tb-Bakterien 2 % 60 Min.
Aspergillus niger 2 % 60 Min.
Vaccinia-Viren inkl. HBV HCV, HIV²⁾ 2 % 10 Min.
Adeno-Viren 2 % 30 Min.
Noro-Viren³⁾ 2 % 15 Min.

Ch.-B./expiry date: see imprint.
Sauganlagendesinfektion 2 % 60 Min.
Bakterien und Pilze¹⁾ 2 % 5 Min.
Tb-Bakterien 2 % 60 Min.
Aspergillus niger 2 % 60 Min.
Vaccinia-Viren inkl. HBV HCV, HIV²⁾ 2 % 10 Min.
Adeno-Viren 2 % 30 Min.
Noro-Viren³⁾ 2 % 15 Min.

Ch.-B./expiry date: see imprint.
Sauganlagendesinfektion 2 % 60 Min.
Bakterien und Pilze¹⁾ 2 % 5 Min.
Tb-Bakterien 2 % 60 Min.
Aspergillus niger 2 % 60 Min.
Vaccinia-Viren inkl. HBV HCV, HIV²⁾ 2 % 10 Min.
Adeno-Viren 2 % 30 Min.
Noro-Viren³⁾ 2 % 15 Min.

Ch.-B./expiry date: see imprint.
Sauganlagendesinfektion 2 % 60 Min.
Bakterien und Pilze¹⁾ 2 % 5 Min.
Tb-Bakterien 2 % 60 Min.
Aspergillus niger 2 % 60 Min.
Vaccinia-Viren inkl. HBV HCV, HIV²⁾ 2 % 10 Min.
Adeno-Viren 2 % 30 Min.
Noro-Viren³⁾ 2 % 15 Min.

Ch.-B./expiry date: see imprint.
Sauganlagendesinfektion 2 % 60 Min.
Bakterien und Pilze¹⁾ 2 % 5 Min.
Tb-Bakterien 2 % 60 Min.
Aspergillus niger 2 % 60 Min.
Vaccinia-Viren inkl. HBV HCV, HIV²⁾ 2 % 10 Min.
Adeno-Viren 2 % 30 Min.
Noro-Viren³⁾ 2 % 15 Min.

Ch.-B./expiry date: see imprint.
Sauganlagendesinfektion 2 % 60 Min.
Bakterien und Pilze¹⁾ 2 % 5 Min.
Tb-Bakterien 2 % 60 Min.
Aspergillus niger 2 % 60 Min.
Vaccinia-Viren inkl. HBV HCV, HIV²⁾ 2 % 10 Min.
Adeno-Viren 2 % 30 Min.
Noro-Viren³⁾ 2 % 15 Min.

Ch.-B./expiry date: see imprint.
Sauganlagendesinfektion 2 % 60 Min.
Bakterien und Pilze¹⁾ 2 % 5 Min.
Tb-Bakterien 2 % 60 Min.
Aspergillus niger 2 % 60 Min.
Vaccinia-Viren inkl. HBV HCV, HIV²⁾ 2 % 10 Min.
Adeno-Viren 2 % 30 Min.
Noro-Viren³⁾ 2 % 15 Min.

Ch.-B./expiry date: see imprint.
Sauganlagendesinfektion 2 % 60 Min.
Bakterien und Pilze¹⁾ 2 % 5 Min.
Tb-Bakterien 2 % 60 Min.
Aspergillus niger 2 % 60 Min.
Vaccinia-Viren inkl. HBV HCV, HIV²⁾ 2 % 10 Min.
Adeno-Viren 2 % 30 Min.
Noro-Viren³⁾ 2 % 15 Min.

Ch.-B./expiry date: see imprint.
Sauganlagendesinfektion 2 % 60 Min.
Bakterien und Pilze¹⁾ 2 % 5 Min.
Tb-Bakterien 2 % 60 Min.
Aspergillus niger 2 % 60 Min.
Vaccinia-Viren inkl. HBV HCV, HIV²⁾ 2 % 10 Min.
Adeno-Viren 2 % 30 Min.
Noro-Viren³⁾ 2 % 15 Min.

Ch.-B./expiry date: see imprint.
Sauganlagendesinfektion 2 % 60 Min.
Bakterien und Pilze¹⁾ 2 % 5 Min.
Tb-Bakterien 2 % 60 Min.
Aspergillus niger 2 % 60 Min.
Vaccinia-Viren inkl. HBV HCV, HIV²⁾ 2 % 10 Min.
Adeno-Viren 2 % 30 Min.
Noro-Viren³⁾ 2 % 15 Min.

Ch.-B./expiry date: see imprint.
Sauganlagendesinfektion 2 % 60 Min.
Bakterien und Pilze¹⁾ 2 % 5 Min.
Tb-Bakterien 2 % 60 Min.
Aspergillus niger 2 % 60 Min.
Vaccinia-Viren inkl. HBV HCV, HIV²⁾ 2 % 10 Min.
Adeno-Viren 2 % 30 Min.
Noro-Viren³⁾ 2 % 15 Min.

Ch.-B./expiry date: see imprint.
Sauganlagendesinfektion 2 % 60 Min.
Bakterien und Pilze¹⁾ 2 % 5 Min.
Tb-Bakterien 2 % 60 Min.
Aspergillus niger 2 % 60 Min.
Vaccinia-Viren inkl. HBV HCV, HIV²⁾ 2 % 10 Min.
Adeno-Viren 2 % 30 Min.
Noro-Viren³⁾ 2 % 15 Min.

Ch.-B./expiry date: see imprint.
Sauganlagendesinfektion 2 % 60 Min.
Bakterien und Pilze¹⁾ 2 % 5 Min.
Tb-Bakterien 2 % 60 Min.
Aspergillus niger 2 % 60 Min.
Vaccinia-Viren inkl. HBV HCV, HIV²⁾ 2 % 10 Min.
Adeno-Viren 2 % 30 Min.
Noro-Viren³⁾ 2 % 15 Min.

Ch.-B./expiry date: see imprint.
Sauganlagendesinfektion 2 % 60 Min.
Bakterien und Pilze¹⁾ 2 % 5 Min.
Tb-Bakterien 2 % 60 Min.
Aspergillus niger 2 % 60 Min.
Vaccinia-Viren inkl. HBV HCV, HIV²⁾ 2 % 10 Min.
Adeno-Viren 2 % 30 Min.
Noro-Viren³⁾ 2 % 15 Min.

Ch.-B./expiry date: see imprint.
Sauganlagendesinfektion 2 % 60 Min.
Bakterien und Pilze¹⁾ 2 % 5 Min.
Tb-Bakterien 2 % 60 Min.
Aspergillus niger 2 % 60 Min.
Vaccinia-Viren inkl. HBV HCV, HIV²⁾ 2 % 10 Min.
Adeno-Viren 2 % 30 Min.
Noro-Viren³⁾ 2 % 15 Min.

Ch.-B./expiry date: see imprint.
Sauganlagendesinfektion 2 % 60 Min.
Bakterien und Pilze¹⁾ 2 % 5 Min.
Tb-Bakterien 2 % 60 Min.
Aspergillus niger 2 % 60 Min.
Vaccinia-Viren inkl. HBV HCV, HIV²⁾ 2 % 10 Min.
Adeno-Viren 2 % 30 Min.
Noro-Viren³⁾ 2 % 15 Min.

Ch.-B./expiry date: see imprint.
Sauganlagendesinfektion 2 % 60 Min.
Bakterien und Pilze¹⁾ 2 % 5 Min.
Tb-Bakterien 2 % 60 Min.
Aspergillus niger 2 % 60 Min.
Vaccinia-Viren inkl. HBV HCV, HIV²⁾ 2 % 10 Min.
Adeno-Viren 2 % 30 Min.
Noro-Viren³⁾ 2 % 15 Min.

Ch.-B./expiry date: see imprint.
Sauganlagendesinfektion 2 % 60 Min.
Bakterien und Pilze¹⁾ 2 % 5 Min.
Tb-Bakterien 2 % 60 Min.
Aspergillus niger 2 % 60 Min.
Vaccinia-Viren inkl. HBV HCV, HIV²⁾ 2 % 10 Min.
Adeno-Viren 2 % 30 Min.
Noro-Viren³⁾ 2 % 15 Min.

Ch.-B./expiry date: see imprint.
Sauganlagendesinfektion 2 % 60 Min.
Bakterien und Pilze¹⁾ 2 % 5 Min.
Tb-Bakterien 2 % 60 Min.
Aspergillus niger 2 % 60 Min.
Vaccinia-Viren inkl. HBV HCV, HIV²⁾ 2 % 10 Min.
Adeno-Viren 2 % 30 Min.
Noro-Viren³⁾ 2 % 15 Min.

Ch.-B./expiry date: see imprint.
Sauganlagendesinfektion 2 % 60 Min.
Bakterien und Pilze¹⁾ 2 % 5 Min.
Tb-Bakterien 2 % 60 Min.
Aspergillus niger 2 % 60 Min.
Vaccinia-Viren inkl. HBV HCV, HIV²⁾ 2 % 10 Min.
Adeno-Viren 2 % 30 Min.
Noro-Viren³⁾ 2 % 15 Min.

Ch.-B./expiry date: see imprint.
Sauganlagendesinfektion 2 % 60 Min.
Bakterien und Pilze¹⁾ 2 % 5 Min.
Tb-Bakterien 2 % 60 Min.
Aspergillus niger 2 % 60 Min.
Vaccinia-Viren inkl. HBV HCV, HIV²⁾ 2 % 10 Min.
Adeno-Viren 2 % 30 Min.
Noro-Viren³⁾ 2 % 15 Min.

Ch.-B./expiry date: see imprint.
Sauganlagendesinfektion 2 % 60 Min.
Bakterien und Pilze¹⁾ 2 % 5 Min.
Tb-Bakterien 2 % 60 Min.
Aspergillus niger 2 % 60 Min.
Vaccinia-Viren inkl. HBV HCV, HIV²⁾ 2 % 10 Min.
Adeno-Viren 2 % 30 Min.
Noro-Viren³⁾ 2 % 15 Min.

Ch.-B./expiry date: see imprint.
Sauganlagendesinfektion 2 % 60 Min.
Bakterien und Pilze¹⁾ 2 % 5 Min.
Tb-Bakterien 2 % 60 Min.
Aspergillus niger 2 % 60 Min.
Vaccinia-Viren inkl. HBV HCV, HIV²⁾ 2 % 10 Min.
Adeno-Viren 2 % 30 Min.
Noro-Viren³⁾ 2 % 15 Min.

Ch.-B./expiry date: see imprint.
Sauganlagendesinfektion 2 % 60 Min.
Bakterien und Pilze¹⁾ 2 % 5 Min.
Tb-Bakterien 2 % 60 Min.
Aspergillus niger 2 % 60 Min.
Vaccinia-Viren inkl. HBV HCV, HIV²⁾ 2 % 10 Min.
Adeno-Viren 2 % 30 Min.
Noro-Viren³⁾ 2 % 15 Min.

Ch.-B./expiry date: see imprint.
Sauganlagendesinfektion 2 % 60 Min.
Bakterien und Pilze¹⁾ 2 % 5 Min.
Tb-Bakterien 2 % 60 Min.
Aspergillus niger 2 % 60 Min.
Vaccinia-Viren inkl. HBV HCV, HIV²⁾ 2 % 10 Min.
Adeno-Viren 2 % 30 Min.
Noro-Viren³⁾ 2 % 15 Min.

Ch.-B./expiry date: see imprint.
Sauganlagendesinfektion 2 % 60 Min.
Bakterien und Pilze¹⁾ 2 % 5 Min.
Tb-Bakterien 2 % 60 Min.
Aspergillus niger 2 % 60 Min.
Vaccinia-Viren inkl. HBV HCV, HIV²⁾ 2 % 10 Min.
Adeno-Viren 2 % 30 Min.
Noro-Viren³⁾ 2 % 15 Min.

Ch.-B./expiry date: see imprint.
Sauganlagendesinfektion 2 % 60 Min.
Bakterien und Pilze¹⁾ 2 % 5 Min.
Tb-Bakterien 2 % 60 Min.
Aspergillus niger 2 % 60 Min.
Vaccinia-Viren inkl. HBV HCV, HIV²⁾ 2 % 10 Min.
Adeno-Viren 2 % 30 Min.
Noro-Viren³⁾ 2 % 15 Min.

Ch.-B./expiry date: see imprint.
Sauganlagendesinfektion 2 % 60 Min.
Bakterien und Pilze¹⁾ 2 %